



Promoción de Derechos y Prevención de Vulneraciones de Niñas, Niños y Adolescentes

Paciente: Yoselin Karina Parra Nizo Cédula de ciudadanía: 123982752

Edad: 28 años Sexo: Femenino EPS: SURA

Observación en Urgencias - 5/08/2022 10:21 a.m.

Especialidad: Animación sociocultural

Finalidad de la consulta: Detección de sensibilidad social

Diagnóstico:

- Dolor localizado en las partes bajas del abdomen, como si las mariposas de las que narran en los cuentos de hadas, quedaran juntamente sepultadas bajo los escombros de un derrumbe del que las niñas y los niños de aquel lugar miran con zozobra.
- 3 días de Cefalea asociada al aturdidor desprendimiento de tierra, ocurrido el día 2 de agosto en horas de la noche, cuando sintieron el crujir de la montaña desprendiéndose, alcanzaron a salir todxs con vida. "profe, ¿usted sabía que yo me quedé sin casa?" Palabras de Alexander Foronda, dichas a Yessica Zuleta.
- Visión borrosa, como si se derrumbaran los sueños de las niñas y los niños directamente afectados por esta situación, como saber que no pueden ir a la escuela porque no tienen con qué.
- Entumecimiento en los dedos, por cargar agua todo el día, ya que el deslizamiento generó un daño en la tubería madre de la zona y algunas casas del sector se encuentran sin acueducto.
- Lumbago, que le impide respirar con tranquilidad, no saber qué pasará de aquí en adelante, volver a empezar, las cosas que con tanto esfuerzo se consiguieron, los juguetes, la ropa, la zozobra ¿dónde dormiremos hoy? ¿qué vamos a comer? ¿y ahora qué hago?
- Nauseas, vómito, delirios recurrentes, angustia, desesperación, preocupación, son síntomas que padecen las personas cuando entran en pánico después de un evento catastrófico.

Recomendaciones:

- Si los síntomas persisten vuelva a consulta (Visite el barrio y ayude).
- Tome los medicamentos según la indicación médica.
- Mantenga el distanciamiento social con personas que sean indiferentes a las calamidades de la comunidad.

Fórmula médica:

- Empatiacilina 800mg cada hora durante 365 días
- Abrazocilina 500 mg cada 3 horas durante 365 días
- Escuchaminofén 600 mg cada hora durante 365 días

Firma del facilitador